

## تزریق ژل ( GEL INJECTION )

هر روز افراد بسیاری با استفاده از عملهای مختلف زیبایی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده و از زندگی خود لذت بیشتری می برند . این اطلاعات فقط برای آگاهی شما ارائه شده است .

بدیهی است جزئیات بیشتر و میزان سود مندی چنین عملی برای شما مواردی هستند که میتوانید با پزشک معالج خود حضوراً مطرح نمایید .

ژلی که در طب جهت تزریق استفاده می شود ، قوامی شبیه ژله خوراکی دارد . این ژل از موادی ساخته شده است که قابل جذب بوده ، برای بدن بی ضرر است و دارای ماندگاری طولانی مدت است . ژلهای از مواد طبیعی موجود در پوست می باشد.مختلفی توسط کارخانه های متفاوت برای مصارف پزشکی تهیه و توزیع می شود . لذا ژلهایی با کیفیتها و قیمتهای متفاوتی وجود دارد . تزریق ژل تحت بیحسی موضعی و توسط سوزن بسیار باریک و نازک انجام می شود و تقریباً بی درد است .

### موارد استفاده ژل در صورت :

۱-برجسته کردن لب

۲-برجسته کردن چانه

۳-پر کردن خط خنده و گونه

۴-پر کردن چین های گوشه های دهان در افراد مسن

۵-پر کردن چین بین دو ابرو

۶-پر کردن چین و چروکهای عمیق صورت یا جای جوش

۷-پر کردن فرو رفتگی اسکار ناشی از زخمهای قدیمی

## آمادگیهای لازم قبل از تزریق ژل :

◇ میزان و نوع ژل و محل تزریق را پزشک معالج تعیین می نماید .

◇ قبل از تزریق ژل و مراجعه به اتاق عمل پوست ، صورت را با آب و

صابون شستشو داده و از چربی ، دارو و یا مواد آرایشی پاک نمائید

◇ در صورت ابتلا به دیابت ، فشار خون بالا ، بیماریهای خاص یا مزمن به پزشک معالج اطلاع دهید .

◇ در صورت مصرف آسپرین ، وارفارین ، هپارین ، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و یا هر نوع داروی دیگری به پزشک معالج اطلاع دهید .

◇ در صورت ابتلا به هر نوع داروی پوستی ، التهاب پوستی و یا بیماریهای بافت همبند به پزشک معالج اطلاع دهید .

◇ در صورت ابتلا به بیماریهای خون ( کم خونی ، کمبود پلاکت ، تالاسمی ، لوسمی و ... ) به پزشک معالج خود اطلاع دهید .

◇ در صورت ابتلاء به بیماریهای عفونی مانند هپاتیت، ایدز و ... به پزشک معالج اطلاع دهید.

◇ در صورت بارداری و یا شیر دهی به پزشک معالج اطلاع دهید.

◇ اگر جزء بیماران دیالیزی، پیوندی و یا بیماران مبتلا به بیماریهای خاص می باشد به پزشک معالج اطلاع دهید

◇ در صورت داشتن حساسیت به هر نوع دارو به پزشک معالج اطلاع دهید.

◇ در صورت داشتن پروتز در صورت یا تزریق ژل غیرقابل جذب در گذشته به پزشک معالج اطلاع دهید.

◇ قبل از مراجعه به اتاق عمل پوست ، غذا میل نموده و ناشتا به اتاق

عمل مراجعه ننمائید

◇ لطفاً قبل از ورود به اتاق عمل موبایل خود را خاموش نمایید.

### مراقبتهای لازم بعد از تزریق ژل :

◇ پس از تزریق ژل روی محل تزریق به مدت ۳ تا ۵ دقیقه کمپرس یخ گذاشته و بعد از ۲ تا ۳ دقیقه مجدداً کمپرس بگذارید

◇ به مدت ۲ تا ۳ ساعت بعد از تزریق ژل سر و گردن را خم ننموده و دراز نکشید و در طی این مدت بایستید ، بنشینید و یا راه بروید .

◇ به مدت چند روز در هنگام استراحت و خواب یک بالش اضافه زیر سر بگذارید .

◇ بروز درد ، ادم ، التهاب و قرمزی در صورت و کبودی ، خون

مردگی و یا کوفتگی در محل تزریق و اطراف محل تزریق ژل

طبیعی است . این عوارض در فاصله ۵ روز الی یک هفته بعد از

تزریق بهبود می یابد . گذاشتن کمپرس یخ در ۲۴ ساعت اول و

کمپرس گرم در ۴۸ ساعت بعد روند بهبودی را تسریع می

نماید .

◇ از ماساژ و مالش پوست صورت جدا خودداری نمائید .

◇ در صورت بروز درد و یا سردرد استامینوفن کدئین مصرف نموده و

از مصرف آسپرین ، پروفن ، ژلوفن ، فننامیک اسید ، ایندو

متاسین و دیکلوفناک به عنوان مسکن خودداری نمائید

◇ داروهای تجویز شده توسط پزشک معالج خصوصاً آنتی بیوتیک

و مسکن را طبق دستور مصرف نمائید .





# تزریق ژل



- ◇ در صورت داشتن پوست تیره پس از تزریق ژل احتمالاً واکنش‌های التهابی خواهید داشت که طبیعی است
- ◇ به مدت یک هفته در معرض گرما، سرما، نور خورشید، مواد شیمیایی، مواد محرک و حساسیت زا، گرد و غبار و . . . قرار نگیرید.
- ◇ در صورت بروز هر گونه مشکل سریعاً به پزشک معالج مراجعه نمائید
- ◇ به مدت ۱۰ روز الی دو هفته پس از تزریق ژل از رفتن به استخر، سونا، جکوزی و سولاریوم جدا خودداری نمائید.
- ◇ در صورت کبودی بیش از حد، رنگ پریدگی شدید، درد بسیار شدید یا بی حسی، زخم در محل تزریق حتماً به پزشک معالج مراجعه فرمایید.

تلفن های بیمارستان:

• ۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات:

• ۵۵۶۳۴۴۶۱

وب سایت:

[razihos.tums.ac.ir](http://razihos.tums.ac.ir)

ایمیل:

[razihospital@sina.tums.ac.ir](mailto:razihospital@sina.tums.ac.ir)