

لیزر PDL

⇒ لیزر PDL درمان موثری برای لکه های شرابی، قرمزی صورت و عروق گشاد ناشی از بیماری روزاسه می باشد



⇒ برای این لیزر از بیمار ابتدا عکس گرفته می شود.
⇒ محل درمان باید کاملاً "تمییز شده و چشم ها حین درمان پوشیده میشوند."
⇒ پالس های لیزر سبب یک احساس سوزش میشود که معمولاً "تا ۱۰ دقیقه بعد از اتمام درمان طول می کشد."

⇒ بعد از درمان بسته به نوع درمان صورت گرفته کبودی بنفش، قرمزی ایجاد میشود که ممکن است ۱-۲ هفته طول بکشد.

⇒ تورم بعد از لیزر اغلب طی ۱ تا ۲ روز برطرف میشود و ممکن است در بعضی نواحی مثل دور چشم شدید باشد.

⇒ استفاده از کیسه یخ برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه هر ساعت میتواند به کاهش تورم کمک کند.



2



⇒ حمام و شستشوی ناحیه درمان شده منعی ندارد اما ناحیه درمان شده باید به آرامی تمیز شود.

⇒ پماد زینک اکساید روزانه ۲ بار روی ناحیه درمان تا ۱ هفته استفاده میشود. اگر در ناحیه ترشح یا دلمه ایجاد شود پماد آنتی بیوتیک روزانه ۲ بار برای کاهش ریسک عفونت باید استفاده شود.

⇒ استفاده از لوازم آرایشی تا یک هفته باید اجتناب شود تا از آسیب پوستی جلوگیری شود.

⇒ در طی درمان ضدآفتاب با SPF ۳۰ یا بالاتر به طور مرتب باید استفاده شود.

⇒ درمان های نوبت بعدی برای بهبود اثربخشی و تفاوت بین مناطق مختلف باید انجام شود.

3

1

عوارض شایع درمان:



⇒ تغییر رنگ پوست در ناحیه درمان شده به خصوص در پوست های تیره شایع می باشد که با مراقبت مناسب از آفتاب طی چند ماه برطرف می شود.

⇒ ریسک اسکار حدود ۱٪ می باشد که اغلب گرد، کوچک، فرورفته و کمرنگ می باشد.

⇒ هدف از درمان روشن کردن محل درمان می باشد. میزان این بهبودی متغیر است و اغلب بهبودی کامل نمی باشد. زمانی که تعدادی درمان برای رسیدن به هدف درمانی انجام شد، درمان مجدد لازم نیست و درمان متوقف می شود.



لیزر PDL

تلفن های بیمارستان:

• ۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن دریافت انتقادات، پیشنهادات و

شکایات:

• ۵۵۶۳۴۴۶۱

وب سایت:

razihos.tums.ac.ir

ایمیل:

razihospital@sina.tums.ac