


میکرونیدلینگ

این روش که به درمان تحریک کلاژن سازی یا CIT نیز معروف است، نوعی روش تحریک مکانیکال جهت ترمیم آسیب های ساختاری است که منجر به بازسازی بافت آسیب دیده و تغییر یافته می گردد.



هدف درمان

بهبود ظاهر و عملکرد پوست می باشد.

طی فرایند میکرونیدلینگ :

با استفاده از سوزنهای بسیار ریز میلیون ها میکروکانال در اپیدرم و درم ایجاد میگردد. وارد کردن سوزن ها به داخل پوست باعث افزایش ترشح فاکتورهای رشد از فیبروبلاست ها و پلاکت های خونی و ترشح فاکتورهای رشد الف و بتا میگردد. این فرایند منجر به افزایش تولید کلاژن و الاستین توسط فیبروبلاست ها میشود. در این روش نفوذ سوزن به داخل پوست باید به حدی باشد که خونریزی های ظریف داخل پوستی ایجاد گردد. در این روش اپیدرم سوراخ میشود اما تخریب نمی شود.

مزایای تکنیک میکرونیدلینگ

- کاهش ریسک اسکار (جای زخم یا جراحی)
- قابل استفاده برای تیپ های پوستی متفاوت
- بسته شدن سریع کانال های ایجاد شده دوره نقاهت کوتاه مدت
- افزایش ضخامت اپیدرم
- افزایش فاکتورهای رشد کلاژن و الاستین

مواردیکه از طریق میکرونیدلینگ می توان درمان کرد؟

- چین و چروک پوست و منافذ صورت
- اسکار (جای زخم و جراحی)
- سوختگی
- استرچ مارک (ترک های پوستی)
- ریزش مو
- تیرگی و لکه های تیره پوست

موارد منع مصرف داریم:

- واکنش های آلرژیک به مواد مورد استفاده
 - بیماری های پوستی (مانند کهیر)
 - سرطان پوست
 - هموفیلی
 - بیماری خود ایمنی
- موارد منع مصرف موقت:



- تبخال

- پس از شیمی درمانی یا پرتو درمانی
- بارداری
- عفونت های تب زا یا بیماری های عفونی
- سرما خوردگی
- با فاصله کم پس از انجام جراحی زیبایی
- ورم ملتحمه

عوارض جانبی

- قرمزی و تورم پوست
- کلویید(ضایعه گوشتی قرمز و برجسته) و اسکار
- تبخال
- هماتوم
- التهاب
- ایجاد لک های تیره

نکات مهم در مورد میکرونییدلینگ

- برای استفاده از این روش در صورت مصرف دارو یا هرگونه بیماری حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
- جهت مشاهده نتیجه مطلوب از میکرونییدلینگ یک جلسه درمان کافی نیست .
- در صورتی که اخیرا از روش های درمانی دیگری جهت جوان سازی پوست استفاده نموده اید می بایست به پزشک خود اطلاع دهید.

مراقبت های پس از انجام میکرونییدلینگ

- ۱- به مدت ۲۴ ساعت به پانسمان محل عمل دست نزنید
- ۲- بعد از ۲۴ ساعت ابتدا دست های خود را به خوبی با آب و صابون شسته و سپس پانسمان را برداشته و محل عمل را با آب و شامپو بچه شسته و خشک نمائید و روزی ۲ مرتبه پماد جنتامایسین تا ۵ روز در موضع عمل استعمال نمائید.
- ۳- داروهای تجویز شده توسط پزشک را طبق دستور استفاده نمائید.
- ۴- در معرض نور خورشید ، سرما، گرما، مواد شیمیائی قرار نگیرید.



تلفن های بیمارستان:

• ۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات:

• ۵۵۶۳۴۴۶۱

وب سایت:

razihos.tums.ac.ir

ایمیل:

razihospital@sina.tums.ac.ir