

## • کراتوآکانتوما

یک تومور پوستی است رشد سریع دارد و ظاهر آن را به دهانه آتش فشان شبیه کرده اند. این تومور شایع و بیشتر در سفیدپستان بروز می کند. مردان بیشتر از زنان مبتلا شده و در میانسالی بیشتر دیده می شود.

## • علت بیماری:

مهمنتین عامل نور آفتاب است و در بعضی موارد تماس با قطران و روغن های معدنی در بروز بیماری موثر می باشد.

## • علائم بالینی:

شروع به صورت یک بر جستگی سفت و قرمز رنگ شبیه زگیل که طی چند هفته به اندازه ۱۰-۲۰ میلیمتر می رسد. قسمت مرکزی ضایعه شاخی شکل و نمایی شبیه به آتش فشان دارد. شایعترین محل بروز قسمت مرکزی صورت (بینی، گونه ها، پلک ها ولب ها) و پس از آن پشت دستها و ساعد است.

## • تشخیص:

شرح حال و معاینه فیزیکی و نمونه برداری

## • سیر بیماری و درمان:

طی سه ماه ممکن است ضایعه خود به خود ببهود یابد ولی اکثراً "جهت تشخیص دقیق درمان برداشت ضایعه ضرورت دارد.

## اقدامات قبل از عمل

۱- شب قبل از عمل حمام نمایید. محل عمل جراحی نباید موی زائد داشته باشد. به این منظور می توانید از کرمهای موبر یا ژیلت یکبار مصرف استفاده کنید.

۲- شب قبل از عمل شام سبک میل نمایید و از ۱۲ شب به بعد ناشتا باشید.

۳- در صورت ابتلاء به دیابت - فشار خون بالا و سایر بیماریها داروهای خود را پس از مشورت با پزشک معالج طبق رووال همیشگی مصرف نمایید.

۴- در صورت مصرف هپارین و یا آسپرین یک هفته قبل از عمل دارو را پس از مشورت با پزشک معالج قطع نمایید.

۵- در صورت مصرف وارفارین به پزشک اطلاع دهید.

۶- در صورت ابتلاء به بیماریهای عفونی مانند هپاتیت-ایذز و ... به پزشک اطلاع دهید.

۷- در صورت مصرف مخدرا یا الکل به پزشک اطلاع دهید.

۸- در صورت داشتن حساسیت به دارو یا مواد غذایی به پزشک اطلاع دهید.

۹- در صورت مصرف هر گونه دارو و یا داشتن اعتیاد به مواد به پزشک خود اطلاع دهید.

۱۰- در صورت بارداری یا شیردهی به پزشک اطلاع دهید.

## اقدامات بعد از عمل

۱- داروی خود را طبق دستور پزشک دقیقاً و کامل مصرف نمایید.

۲- اگر پانسمان در موضع وضو است برای نماز روی سنگ مرمر تیم می کنید.

شستشو و حمام روزانه با آب و لرم و

صابون و شامپوی ملایم



# کر اتو آکانتوما



تلفن های بیمارستان:

۰۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن های گویای بیمارستان (نوبت دهی):

۰۶۷۳۹۵۰۶۰

پیامک بیمارستان

۰۳۰۰۰۲۴۰

وب سایت:

[razihos.tums.ac.ir](http://razihos.tums.ac.ir)

ایمیل: [razihospital@sina.tums.ac.ir](mailto:razihospital@sina.tums.ac.ir)

تهییه کننده: کارگروه آموزش سلامت

بیمارستان رازی

GOR-Pa-19-03

-۹- در صورتیکه از قسمتی از بدن شما پوست برداشته شده باشد، پانسمان ناحیه عمل و محلی که از آن بوست برداشته شده است ، به مدت ۵ روز باقی می ماند و در روز مراجعه به درمانگاه باز می شود. در طی این ۵ روز از هرگونه دستکاری محل عمل توسط خود و همراهان جداً خودداری نمایید.

-۱۰- پس از درمانگاه، میتوانید استحمام نمایید. موضع عمل و ناحیه ای که از آن بوست برداشته شده است را روزانه با دست و آب و لرم و شامپو بچه شستشو دهید و پس از خشک نمودن روی هر دو موضع روزی ۲ بار پماد جنتامايسین بمالید.



-۱۱- یکماه پس از تاریخ جراحی جواب آزمایش ( نمونه ) خود را پیگیری نمایید و در صورت آماده بودن جواب در روز درمانگاه پزشک مریبوطه به درمانگاه مراجعه نمایید .

-۱۲- در صورتیکه از قسمتی از بدن شما پوست برداشته شده باشد، اگراین ناحیه ترشح دارد، برای خشک کردن این ناحیه از سشووار استفاده نمایید و چنانچه خشک است از پماد جنتامايسین استفاده نمایید.

-۱۳- تاریخ مراجعه بعدی به درمانگاه جهت ویزیت و کشیدن بخیه ها به طور کتبی و شفاهی هنگام ترجیص به شما آموزش داده می شود.