

آمادگی جهت انجام سی تی اسکن با کنتراست خوراکی و تزریقی (بیماران بستری)
برای انجام سی تی اسکن شما بطور مختصر و خیلی کم در معرض تابش های یونیزه شده قرار می
گیرد. به خاطر داشته باشید که سی تی اسکن مزایای زیادی دارد و به همین خاطر می توان از
احتمالات کوچک خطر چشم پوشی کرد.

موارد منع انجام سی تی اسکن :

- در بانوان باردار انجام سی تی اسکن ممنوع است .
- بیماران مبتلا به آسم و تنگی نفس و حساسیت مفرط به دارو و مولتیپل میلوما و در
بیماران با کراتینین بالا.

آمادگی های لازم جهت انجام سی تی اسکن با کنتراست خوراکی :

- 6-8 ساعت قبل از انجام آزمون بیمار باید ناشتا باشید.
- بطری اول را هر 1 ساعت 2 لیوان میل کنید.
- بطری دوم را هر یک ربع 1 لیوان میل کنید وقتی یک سوم بطری باقی ماند به بخش CT
اسکن اطلاع دهید لیوان آخر را روی تخت CT اسکن میل کنید.
- در صورت اورژانسی بودن و درخواست پزشک مربوطه زمان بندی با مشورت و اطلاع بخش
تغییر خواهد یافت.
- آنژیوکت سبز یا صورتی حد امکان آنتی کوپیتال از بیمار گرفته شود.
- بیمار به همراه پرستار و اطلاع پزشک طب اورژانس (در زمان اورژانسی بودن و عدم حضور
مسئول فنی رادیولوژی) در بخش حاضر شود.
- روغن کرچک برای بیمارانی که اسهال دارند مجاز نمی باشد.
- در صورتیکه قرص متفورمین استفاده می کنید ، دو روز قبل از انجام سی تی اسکن
مصرف آن قطع و بایستی یک روز پس از انجام سی تی اسکن و پس از تکرار آزمایش
کراتینین و نرمال بودن جواب ، مصرف قرص از سر گرفته شود.
- آزمایش کراتینین باید زیر 1.5 باشد.
- مدارک قبلی (سونوگرافی، سی تی اسکن، کولونسکوپی ، آندوسکوپی) آورده شود.
- 3 عدد ویزپیک SOCE (2 عدد تزریقی 1 عدد خوراکی) تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت
- تعداد دارو نسبت به وزن بیمار متغیر است.