

آمادگی جهت انجام سی تی اسکن با کنتراست خوراکی و تزریقی (بیماران سرپایی)

**وقت تعیین شده برای شما روز.....تاریخ.....ساعت.....می باشد. در صورت عدم امکان حضور با شماره تلفن بیمارستان 52888282 داخلی 8110 تماس بگیرید.**

برای انجام سی تی اسکن شما بطور مختصر و خیلی کم در معرض تابش های یونیزه شده قرار می گیرید. به خاطر داشته باشید که سی تی اسکن مزایای زیادی دارد و به همین خاطر می توان از احتمالات کوچک خطر چشم پوشی کرد.

### موارد منع انجام سی تی اسکن :

- در بانوان باردار انجام سی تی اسکن ممنوع است .
- بیماران مبتلا به آسم و تنگی نفس و حساسیت مفرط به دارو و مولتیپل میلوما و کراتینین بالا.
- **آمادگی های لازم جهت انجام سی تی اسکن با کنتراست خوراکی :**
- 6-8 ساعت قبل از انجام آزمون بیمار باید ناشتا باشید.
- ساعت 18 غروب یک شام سبک میل کنید(غذاهای بدون نفخ)
- ساعت 19 یک شیشه روغن کرچک بخورید.(در صورت حساسیت به روغن کرچک قرص بیزاکودیل یا لاگزاریسین یا شیاف بیزاکودیل استفاده کنید)
- ساعت 23 شب 2 لیوان آب معدنی حاوی دارو میل شود.
- ساعت 24 شب 2 لیوان آب معدنی حاوی دارو میل کنید.
- ساعت 1 شب 2 لیوان آب معدنی حاوی دارو میل کنید.
- ساعت 3 صبح 2 لیوان آب معدنی حاوی دارو میل کنید
- ساعت 5 صبح 2 لیوان آب معدنی حاوی دارو میل کنید.
- ساعت 8 صبح با یک بطری آب معدنی بزرگ دیگر به مرکز مراجعه کنید و آن را تحویل کارشناسان دهید تا ماده کنتراست داخل آن بریزند پس از آن هر یک ربع 1 لیوان آب معدنی حاوی دارو میل کنید.
- حدود 1 لیوان آب معدنی را نگه دارید و آن را روی تخت سی تی اسکن میل کنید.
- در صورتیکه قرص متفورمین استفاده می کنید ، دو روز قبل از انجام سی تی اسکن مصرف آن قطع و بایستی یک روز پس از انجام سی تی اسکن و پس از تکرار آزمایش کراتینین و نرمال بودن جواب ، مصرف قرص از سر گرفته شود.
- آزمایش کراتینین باید زیر 1.5 باشد.
- مدارک قبلی (سونوگرافی، سی تی اسکن، کولونوسکوپی ، آندوسکوپی) آورده شود.
- 3 عدد ویزپیک (SOCE 2) تزریقی 1 عدد خوراکی )
- تعداد دارو نسبت به وزن بیمار متغیر است.

**تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت بیمارستان رازی**

**RA-Pa-10-03**