



بیمارستان رازی

دانشکده علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تهران

آیا از بیماری دیابت (افزایش قند خون) آگاهی دارید؟

DIABETES

تلفن های بیمارستان:

• ۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات:

• ۵۵۶۳۴۴۶۱

بیامک بیمارستان

• ۳۰۰۰۲۴۰

وب سایت:

razihos.tums.ac.ir

ایمیل:

razihospital@sina.tums.ac.ir

تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت
بیمارستان رازی

IIW-Pa-02- 03

علائم کاهش قند خون کدام است؟

علائم کاهش قند خون شامل احساس عصبانیت، ضعف و بی حالی، عرق سرد و مرطوب، تپش قلب، رنگ پریدگی، احساس گرسنگی بیش از حد، لرزش اندام ها، تاری دید و سردرد و عدم درمان به موقع منجر به اختلال حواس و تشنج و بیهوشی می شود.

اقدامات موثر در صورت کاهش قند

ابتدا 15 گرم کربوهیدراتات سریع الاثر مانند یک لیوان آب با 3 حبه قند یا نصف لیوان آب میوه مصرف کنید 15 دقیقه صبر کنید. در اینجا دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد، حالت اول این است که علائم افت قندخون برطرف شوند. حال می توانید مواد حاوی کربوهیدرات طولانی اثر مانند یک لقمه نان و پنیر مصرف کنید تا از افت قندخون مجدد جلوگیری شود. اگر تا وعده غذایی اصلی بیش تر از یک ساعت باقی مانده بود باید یک میان وعده سبک هم مصرف نمایید. حالت دوم آن است که بعد از گذشت 15 دقیقه همچنان علائم افت قند خون باقی بماند، در این صورت مجدداً 15 گرم کربوهیدراتات مصرف کنید و 15 دقیقه دیگر منتظر بمانید این کار را انقدر ادامه می دهید تا قند خون شما افزایش یابد. سپس اگر بیش از یک ساعت تا وعده غذایی اصلی تان باقی مانده است، میان وعده مصرف نمایید.

ورزش کنید.

ورزش، پاسخ دهنده سلول های بدن به انسولین را افزایش می دهد، در نتیجه غلظت قند خون کاهش می یابد. پیاده روی، در صورتی که حداقل 3 تا 4 بار در هفته و هر بار به مدت 45 دقیقه انجام شود ورزش مناسبی برای شروع فعالیت بدنی است. می توانید به جای 30 دقیقه ورزش پیوسته، در طول روز 3 بار و هر بار 10 دقیقه ورزش نمایید. بهترین زمان انجام ورزش، 1 تا 3 ساعت بعد از صرف غذا است. بهتر است مدت و شدت فعالیت ورزشی خود را به مرتبه افزایش دهید. به میزان کافی آب بنوشید تا جایگزین مایعی که حین ورزش که در اثر عرق کردن از بدن شما دفع شده است شود. قبل از شروع هر نوع ورزش و یا فعالیت بدنی، حتماً با پزشک خود در این مورد مشورت کنید و از یاد نبرید که اگر تاکنون فعالیت بدنی نداشته اید، نباید ناگهان، آن هم به مدت زیاد، فعالیت کنید.

علائم افزایش قند خون کدام است؟

تشنجی شدید، افزایش حجم و دفعات تخلیه ادرار، کاهش وزن و اشتهاي بیش از حد در این موقع سعی کنید مقادیر زیادی مایعات بدون قند مصرف کنید و پس از اندازه گیری قندخون به پزشک مراجعه نمایید.

برنامه صحیح غذایی را رعایت کنید.

در هر وعده غذایی از کربوهیدرات‌های پیچیده استفاده کنید. غذاهای نشاسته‌ای مانند نان (ترجیحاً سبوس‌دار)، غلات، میوه‌ها، سبزیجات و برنج حاوی کربوهیدرات‌های پیچیده هستند. اگر این غذاها بیش از حد مصرف شوند، به چربی تبدیل شده و باعث اضافه وزن می‌شوند. چاقی سبب افزایش مقاومت انسولین بدن به انسولین شده و در نتیجه باعث بروز بیماری دیابت یا تشدید آن می‌شود.

هر روز از مواد غذایی حاوی پروتئین مانند گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ و پنیر استفاده نمایید.

از سبزی‌های مواد معدنی و ویتامین‌هایی که برای سلامت بدن ضروری هستند استفاده نمایید.

از مصرف بیش از حد غذاهای شیرین مانند نوشابه‌ها، کیک‌ها، بیسکویت‌های شیرین، شکلات، عسل و آبمیوه‌ها دارای مقادیر زیادی قند ساده هستند پر هیز نمایید.

از مصرف غذاهای پر چربی از جمله کره، مارگارین، روغن‌ها، کره بادام زمینی و گوشت پر چرب. غذاهایی مانند سوسیس، پنیر، کیک، شکلات، بستنی، سبزیجات سرخ شده و سس‌های پر هیز کنید.



انواع دیابت کدامند؟

دیابت نوع 1

بیمارانی که مبتلا به دیابت نوع 1 هستند اغلب لاغرند و معمولاً در گروه سنی کودکان، نوجوانان و جوانان هستند. در بدن این افراد، اصلاً انسولین ساخته نمی‌شود و یا به مقدار بسیار ناچیز تولید می‌شود و برای جبران کمبود آن باید انسولین به بدن بیمار تزریق نمود.

دیابت نوع 2

اغلب بیماران مبتلا به این نوع از دیابت چاق و در سنین بالا هستند. این افراد می‌توانند مدت‌ها با تغذیه صحیح و کاهش وزن درمان شوند زیرا در بدن این نوع دیابتی‌ها، تا پیش از مراحل پیشرفت‌های بیماری، انسولین به اندازه کافی ساخته می‌شود و در صورت کاهش وزن می‌توانند مدت‌ها بدون تزریق انسولین درمان شوند اما در برخی از این بیماران، برای مهار قند خون مصرف داروهای خوارکی و یا انسولین لازم است.

درمان دیابت چگونه است؟

دیابت نوع 2 به خوبی قابل درمان است. خیلی وقت‌ها به واسطه تغییر شیوه زندگی که شامل رعایت برنامه غذایی معتدل و ورزش است درمان بیماری ممکن است. در مواقعي که تغییر عادات زندگی، غیر عملی یا بی‌اثر باشد، می‌توان از درمان دارويی استفاده کرد.

وزن خود را کاهش دهید.

اضافه وزن حتی به مقدار کم، به خصوص اگر چربی در ناحیه شکم ذخیره شده باشد، خطر پیشرفت دیابت نوع دو، افزایش فشار خون و افزایش سطح کلسیترول خون را در بر دارد.

دیابت چیست؟

دیابت نوعی بیماری است که در آن مقدار قند خون فرد مبتلا به طور مداوم زیاد است. افزایش قند خون دو علت می‌تواند داشته باشد، یا لوز المعده قادر نیست به مقدار کافی انسولین ترشح کند و یا انسولین‌های بدن نمی‌توانند به انسولین ترشح شده پاسخ داده و قند خون را مصرف نمایند. انسولین هورمونی است که توسط لوز المعده در بدن تولید و باعث می‌شود قند یا به عبارتی انرژی حاصل از مصرف غذاها در بدن مورد استفاده قرار گیرد.

نشانه‌های دیابت چیست؟

- دیابت غالباً یک بیماری بی‌سر و صدا است. در برخی از بیماران افزایش قند خون علائم زیر را ایجاد نماید:
- تکرر ادرار
 - کاهش وزن
 - تشنجی فراوان
 - ضعف و کاهش نیروی جسمی
 - دیر بهبود یافتن رخمهای و عفونت

خطرات ناشی از دیابت چیست؟

اگر قند خون به طور مستمر و طی سالیان متتمادي، بالا باشد با اثر بر عروق کوچک و اعصاب، عوارض دیررس دیابت در چشم‌ها، کلیه‌ها و پاهای بروز خواهد کرد.

