



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تهران



بیمارستان رازی

نحوه نمونه گیری آزمایش خون مخفی در مدفوع

* گاهی اوقات خونریزیهای مختصری در بخشهای مختلف دستگاه گوارش اتفاق می افتد که به علت مقدار کم با چشم قابل دیدن نیست. بنابراین باید با روشهای آزمایشگاهی تشخیص داده شود. بهتر است این آزمایش در ۳ نوبت انجام شود.

- برای انجام این آزمایش باید نکات زیر رعایت گردد:
 - ۲۴-۷۲ ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ و ماکیان)، ماهی، شلغم و تربچه خودداری نمایید.
 - منع مصرف داروهای زیر تا ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع:
 - آهن- ایندومتاسین- کلشی سین- آسپیرین- بروفن- کورتونها و ویتامین C باید ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش و در طول دوره جمع آوری نمونه قطع شود.
 - در صورت خونریزی از لثه در حین تمیز کردن دهان و دندان در طی ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان اجتناب نمایید.
 - نمونه باید سریعا به آزمایشگاه تحویل داده شود. (کمتر از یک ساعت)
 - نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود.
- * در طی ۲ ساعت آمادگی از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی (آب در حد متعارف اشکالی ندارد) خود داری نمائید.

تلفن های بیمارستان:

• ۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن های گویای بیمارستان (نوبت دهی):

• ۶۷۳۹۵۰۶۰