

هنگام اجابت مزاج وضعیت طبیعی (نیمه چمباتمه) داشته باشید.



رژیم غذایی:

مددجوی عزیز توصیه میشود از غذای پرفیبر مانند:

• غلات کامل (مانند: نان سبوس دار)، حبوبات (مانند: عدس)

انواع سبزیجات (مانند: سالاد حاوی خیار، گوجه فرنگی، کاهو، کلم و هویج به همراه روغن زیتون)، میوه ها به خصوص

آنهايي که میتوان با پوست و دانه مصرف کرد (مانند: سیب، گلابی، توت فرنگی، کشمش، خرما) و آجیل مصرف کنید

• توصیه میگردد غذا را در وعده های زیاد و حجم کم و در فواصل زمانی منظم مصرف نمایید.

• مایعات فراوان (۸ لیوان در روز) بنوشید.

• توصیه میشود که سبوس گندم را با یک قاشق مرباخوری در روز شروع و به تدریج به ۶ الی ۴ قاشق غذاخوری افزایش دهید.

• از مصرف بیش از حد شیرینی، قهوه و شکلات اجتناب شود.

• از خوردن سیب بدون پوست، انار، ماست و به (که باعث نفخ و بیوست میشود) اجتناب کنید.

عارض:

افزایش فشارخون

هموروئید (بواسیر)

سخت شدن مدفوع

فیشر (زخم مقعد)

مگاکولون (روده متسع و بدون تون عضلانی)

درمان:

صرف بی رویه ملینهها را قطع کنید.

از مواد غذایی پر فیبر و مایعات کافی استفاده کنید.

برنامه‌ی منظم ورزشی برای تقویت عضلات شکم

طبق دستور پزشک از داروهای مناسب استفاده کنید.

ممکن است برای رفع بیوست برای شما از تنقیه یا انما در مراکز درمانی استفاده شود و یا پزشک به شما توصیه کند،

برای یافتن علت بیوست تستهای تشخیصی انجام دهید.

برای برطرف شدن بیوست به نکات زیر توجه کنید:

فعالیت:

مددجوی عزیز توصیه میشود ورزشهای منظم مثل:

پیاده روی و نرمیش که باعث افزایش حرکات روده می شوند را انجام دهید.

توصیه می گردد برای تقویت عضلات شکم ورزشهای منظم

(شامل انقباض شکم و بالا آوردن پaha) تا سطح قفسه‌ی سینه ۴

بار در روز هر بار (۱۰ الی ۲۰ دفعه) را انجام دهید.

بی نظمی و یا کاهش غیر طبیعی دفعات دفع مدفوع کمتر از (۲ الی ۳ بار در هفته) را بیوست گویند.

سخت شدن غیرطبیعی مدفوع، عبور آن را مشکل ساخته و گاهی با درد، کاهش در حجم مدفوع یا باقی ماندن طولانی مدت مدفوع در راست روده همراه است.

علل:

- استفاده از برخی داروها مانند: آرامبخشها، مخدراها، ضدآفسردگیها، شربت معده (آنتی اسیدهای آلومینیوم دار) و قرصهای آهن.

اختلالات مربوط به راست روده و مقعد (مانند: هموروئید و فیشر).

انسداد روده (مانند: سرطان روده).

سایر علل (مانند: استراحت طولانی مدت در بستر، ضعف و بیحرکتی و خستگی، کاهش مصرف رژیم پرفیبر و دریافت ناکافی مایعات، استرسهای زیاد در زندگی).

علائم:

*تفخ و اتساع شکم

*قار و قور کردن روده

*درد و احساس فشار

*احساس خالی نشدن روده

*سردرد و خستگی

*کاهش اشتها

*فشار هنگام دفع



بیمارستان رازی



دستگاه همراه پرداز
خدمات بهداشتی درمانی تهران

چگونه از بیوست پیشگیری کنیم؟

تلفن های بیمارستان:

۵۲۸۸۲۸۲

تلفن دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات:

۵۵۶۳۴۴۶۱

پیامک بیمارستان

۳۰۰۰۲۴۰

وب سایت:

razihospital.tums.ac.ir

ایمیل: razihospital@sina.tums.ac.ir

تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت
بیمارستان رازی

IIW-Pa-31- 03

سایر نکات آموزشی:

- جهت داشتن برنامه‌ی منظم دفعی؛ در زمان مشخص اجابت مزاج داشته باشید(مثلاً نیم ساعت پس از مصرف غذا به خصوص صباحانه به دستشویی رفته و بدون زور زدن اجازه دهید شکم شما کار کند).
- در صورت احساس دفع، اجابت مزاج انجام دهید و احساس دفع نادیده گرفته نشود.
- از استرس و ناراحتی اجتناب کنید.

- برای نرم کردن مدفوع از روغن زیتون، آلو، انجیر، کیوی، خاکشیر و شیر سرد استفاده کنید.

- بهتر است از داروها بطور مداوم و مستمر استفاده نشود (به خصوص بیزاکودیل) و از داروهای متفاوت در دوره‌های مختلف و تنها با نظر پزشک استفاده گردد.

نکات قابل توجه هنگام مصرف داروها:

- در صورت تجویز هیدروکسید منیزیم به یاد داشته باشید دارو را با معده خالی و همراه با یک لیوان آب میل نمائید و از مصرف دارو هنگام خواب یا آخر شب اجتناب کنید.

- در صورت تجویز بیزاکودیل به یاد داشته باشید قرص را یک ساعت قبل یا ۲ ساعت پس از صرف غذا همراه با یک لیوان آب میل نمائید. قرص را هنگام خواب و یا قبل از صباحانه میل نمائید و نیز از مصرف شیر یا شربت با آنتی اسید یا همراه با قرص اجتناب کنید.

- در صورت تجویز سوربیتول توصیه میشود دارو قبل از غذا استفاده شود. محتويات هر بسته از دارو در نصف لیوان آب خنک ریخته شده و محلول به دست آمده به تعداد دفعات توصیه شده در روز میل شود.

سالمندان ۵ برابر افراد
جوان در معرض بیوست
میباشند. از اینرو باید در
رزیم غذایی خودغذاهای
پرفیبر و مایعات فراوان را
بگنجانند.