

وسیله ای است که در زیر پوست کار گذاشته می شود و نیاز به تزریق از رگ های محیطی را بر طرف می سازد. محل کارگذاری آن معمولاً در روی جدار قفسه سینه در سمت راست یا چپ است. هر پورت حدوداً قابلیت ۱۰۰۰ بار تزریق را دارد.

## کاربرد پورت

از طریق پورت می توان داروی شیمی درمانی، تزریق خون، آنتی بیوتیک و سرم را بدون نیاز به سوراخ کردن رگ تزریق کرد. همچنین می توان در صورت نیاز، برای گرفتن نمونه خون آزمایشات نیز از آن استفاده کرد.

## مدت زمان استفاده از پورت

در صورت استفاده صحیح، پورت را می توان برای هفته ها و ماه ها استفاده کرد و در صورت مراقبت مناسب تا سال ها نگه داشت.

## نحوه جایگذاری پورت

توسط جراح عروق و یا جراح سرطان با بی حسی موضعی در مدت کمتر از ۳۰ دقیقه گذاشته می شود این عمل سرپایی به حساب آمده و دردناک نمی باشد.

## مراقبت های بعد از پورت گذاری

دو روز بعد از عمل پورت گذاری پانسمان محل پورت تعویض می گردد. در هفته اول ممکن است درد خفیف و کبودی را در محل نصب پورت تجربه کنید. جهت رفع این درد مصرف مسکن ساده مانند استامینوفن به شما کمک خواهد کرد. بخیه هایی که بر روی پوست زده می شود بعد از معاینه و اجازه بعد قابل کشیدن می باشد. ممکن است بخیه ها جذبی بوده و نیاز به کشیدن نداشته باشد. در صورت ترشحات چرکی، باقی ماندن قرمزی و تورم اطراف محل پوست بعد از یک هفته حتماً به پزشک خود مراجعه کنید.

## چگونه از پورت استفاده می شود؟

استفاده از پورت باید توسط پرستار و یا فرد آموزش دیده و آشنا با پورت و در شرایط کاملاً استریل صورت گیرد. ابتدا دست ها شسته شده و محل با بتادین ضدعفونی گردد و سپس سوزن مخصوص از طریق پوست وارد محفظه می گردد در صورت نیاز ممکن است بلافاصله بعد از پورت گذاری از آن برای تزریق استفاده شود.


## نحوه شستشوی پورت

در ناحیه پورت ۲۰ میلی لیتر سرم نمکی آغشته به مواد ضد انعقاد خون به داخل پورت تزریق می گردد تا از لخته شدن خون داخل پورت جلوگیری شود و سپس سوزن پورت کشیده می شود. اگر بطور منظم از پورت استفاده نشود لازم است پورت ماهیانه توسط پرستار مجرب شستشو داده شود.

در مورد

## پورت گذاری

چه می دانید؟



تلفن های بیمارستان:

۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن های گویای بیمارستان (نوبت

دهی):

۶۷۳۹۵۰۶۰

پیامک بیمارستان

۳۰۰۰۲۴۰

وب سایت:

razihospital.tums.ac.ir

ایمیل: razihospital@sina.tums.ac.ir

تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت بیمارستان

رازی

IIW-Pa-33- 03

آیا وجود پورت در تصویر برداری اختلال

ایجاد می کند؟

خیر شما با وجود پورت می توانید سی تی اسکن،  
ام. ار. ای را براحتی انجام دهید.

## موارد قابل توجه

- عفونت ممکن است در داخل لوله یا اطراف پورت ایجاد شود در صورت مشاهده فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.
- مشاهده نواحی قرمز و متورم یا دردناک اطراف پوست ناحیه پورت گذاری شده.
- علایمی مانند تب، تنگی نفس، لرز و سرگیجه.
- در صورت لخته شدن خون در داخل پورت و یا عفونت شدید ممکن است نیاز به خروج پورت باشد.