


تعریف بیماری:

AGEP نوعی بیماری حاد پوسچولی (دانه چرکی) جنرالیزه ی پوستی می باشد که اغلب در پاسخ به حساسیت های دارویی خصوصا داروهای بتالاکتام ایجاد می گردد



معمولا پنج تا ده روز پس از دریافت داروهای حساسیت زا بثورات جلدی AGEP شروع می شود. بثورات جلدی اغلب در ناحیه ی صورت و زیربغل و کشاله های ران ایجاد می شوند و ممکن است این ضایعات گسترش یابند.

علائم بیماری:

- قرمزی پوست
- ضایعات کوچک پرشده از مایع زرد رنگ و یا سفید رنگ و ضایعات جوش مانند چرکی مشهود است.
- تورم صورت و اندام های درگیر
- تب و افزایش دمای بدن

بثورات جلدی ممکن است یک تا دو هفته به طول بیانجامد و پس از آن پوسته ریزی شروع می شود.

تشخیص:

این بیماری معمولا به صورت بالینی و از طریق علائم آن تشخیص داده می شود. سایر راه های تشخیصی تکمیلی شامل نمونه برداری از پوست و آزمایش خون و بررسی گلبول های سفید خونی می باشد. در AGEP نوتروفیل ها افزایش پیدا می کنند.

درمان بیماری:

بلافاصله تمام داروهای مصرفی بیمار که ممکن است حساسیت ایجاد کرده باشد باید قطع گردد. سایر گزینه های درمان شامل:

- مرطوب کننده های موضعی
- کورتیکواستروئید ها
- آنتی هیستامین ها

AGEP



تلفن های بیمارستان:

• ۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات:

• ۵۵۶۳۴۴۶۱

پیامک بیمارستان

• ۳۰۰۰۲۴۰

وب سایت:

razihos.tums.ac.ir

ایمیل:

razihospital@sina.tums.ac.ir

تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت

بیمارستان رازی

WIW-Pa-03-06

از استفاده ی بی رویه ی
کورتیکواستروئید ها بدون اطلاع پزشک
جدا خودداری فرمایید.

نکات مورد توجه:

۱. روزانه استحمام با شامپو ملایم انجام دهید.
۲. از دستکاری ضایعات بپرهیزید.
۳. نظافت فردی را رعایت کنید.
۴. از مصرف هرگونه دارو بدون دستور پزشک خودداری کنید.
۵. به هیچ عنوان از داروهایی که باعث ایجاد علائم بیماری گردیده است مجدد استفاده نکنید.