

درمان

اگر بیماری محدود به پوست باشد، ۳ روشن برای درمان است.

۱- اشجه مایه‌ای بنشش با طول موج کوتاه و با طول موج بلند همراه با پسورالن (puva)

۲- نیتروژن و فدئوپلاسم موستارد موضعی (کمoterاپی توپیکال)

۳- درمان تمامی بدن با electrobeam کورتیکواستروئید موضعی - UVB - (تینوئید همراه با PUVA ، رادیوتراپی

عوارض جانبی نیتروژن موستارد : فارش هیبریدی‌گماناتاسیون - هرپس زوستر - آلوپسی - وزوز - کاهش شنوایی است. آموزش به بیمار : از عوارض این دارو کاهش پلاکتهای فون است که باید برای پیشگیری از افتادن و یا دیگر مراحتات ناشی از ضربه احتیاط کرد.

عموماً بیماری با ضایعات په (بثورات قرمز و برجسته گوچک) شروع می‌شود این پمپهای قرمز رنگ اغلب همراه با التهاب و فارش است ، تهاجم به پوست مشخصاً با ، پوسته ریزی و فارش همراه است و بدون تشخیص سالها باقی می‌ماند و یا فود به فود بهبود می‌یابد.

تشخیص :

اساس تشخیص بر اساس شکل ضایعات در مرافق مختلف بیماری می‌باشد.

مهمترین (وش) تشخیص بیوپسی‌های مختلف پوستی در (زمانهای مختلف است

مطالعات (وی) فون ممیطی



2

بیماری MF چیست؟

لفوم پوستی سلولهای T به مساب می‌آید ضایعات پوستی در اثر تکثیر سلولهای T بدفیم که قدرت مهارت به اپیدره را دارند ایجاد می‌شود. نمای بالینی ضایعات به ۳ مرحله تقسیم می‌شود . ۱- په لکه (ضایعات بدون فرورفتگی و برآمدگی و غیر قابل لمس))



۲- پلاک (قابل لمس و برجسته بزرگتر از ۰.۵ سانتی متر)



۳- وضایعات ندولی (سفت و قابل لمس در سه بعد عرض، طول و عمق) (همی شدن متغیر است).



غلت بیماری ناشناخته میباشد ولی

در (MF) شیوع آلالجی و عفونتها ویروسی و قارچی بیشتر است .

3

1

بیماری MF



تلفن های بیمارستان:

۵۲۸۸۸۲۸۲

بیامک بیمارستان

۳۰۰۰۲۴۰

وب سایت:

razihos.tums.ac.ir

ایمیل: razihospital@sina.tums.ac.ir

تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت
بیمارستان رازی

W-W-Pa-16-03

در فتوترایپی بیمار دارویی بنام پسورالن می خورد



که مساستیت به نور پیدا می کند و ۲ ساعت بعد

او را زیر تابش اشعه مأورای بنسفل (A) شدید

قرار می دهد . بیمار محمولا / ۲۰ تا ۳۰ بار در هفته

تمت درمان قرار می گیرد بین جلسات ۱۴۸

ساعت فاصله است تبعیع یکی از عوارض پسورالن

است که باید با غذا مصرف شود و معاینات دوره ای

چشم جهت پیشگیری از کاتاراکت انجام گردد.. به دلیل

عارض پوپا زنان هوانی که در دوران باروری هستند

باید از بارداری جلوگیری کنند.

مراقبت زیادی از دندانها به عمل آورید و از تمدیک و
یا زخمی کردن لثه ها و سایر بافت‌های دهانی ابتدا
کنید.

منابع:

• بیماریهای پوست، تشخیص و درمان(هبیف)،
ترجمه دکتر کامران بليغى، ۱۳۹۱

• راهنمای بیماریهای شایع پوست و مو، دکتر
ممسن فیاض