

درمان :



- ♦ انتی بیوتیک
- ♦ قرار گرفتن در معرض آفتاب
- ♦ داروهای موضعی
- ♦ کورتون
- ♦ فتوترپی



آموزش به بیمار :

⇒ رعایت بهداشت فردی ضروری است.

علائم بیماری:



غیر از علائم پوستی
بیشتر افراد مبتلا
،علائم و نشانه
دیگری تجربه
نمیکنند.با این حال
برخی ممکن است
تب ، سردرد، درد
مفاصل و تورم گره
های لنفاوی را
تجربه کنند.



تشخیص :

بر اساس علائم نشانه ها و نمونه
برداری از زخم قابل تشخیص می باشد.



شکل حاد بیماری پوستی است که افراد
مبتلا ضایعات قرمز رنگ کوچک و برجسته
دارند.

این ضایعات قرمز میتوانند تقریباً هر قسمت
از بدن را تحت تاثیر قرار دهند بیشتر آن
معمولاً روی تنه ، کمر ، دستها و پاها ایجاد
می شود.



علت شناسی:

علت دقیق آن ناشناخته است .

PLEVA

pityriasisa lichenoides et acuta varoliformi



تلفن های بیمارستان:

• ۵۲۸۸۸۲۸۲

پیامک بیمارستان

• ۳۰۰۰۲۴۰

وب سایت:

razihos.tums.ac.ir

ایمیل:

razihospital@sina.tums.ac.ir

تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت

بیمارستان رازی

WIW-Pa-17-03

از دستکاری کردن و کندن ضایعات
خودداری گردد.

دبه علت استفاده از کورتون رعایت رژیم
غذایی کم نمک، کم چرب و کم
کربوهیدرات توصیه میشود و داروی
کورتون پس از غذا استفاده شود و مصرف
لبنیات به مقدار زیاد توصیه میگردد.



پیش آگهی:

برای افراد مختلف متفاوت است اما به طور
کلی پیش آگهی خوب است. اغلب موارد
در عرض چند هفته تا چند ماه بهبود پیدا
میکند.