

نکرولیز سمی اپیدرم:

بیماری پوستی و مخاطی کشنده ایجاد تاول در سراسر بدن و کنده شدن پوست و مخاط همراه است.

علت بیماری:

- ♦ اکثر بیماران ۱-۳ هفته قبل از شروع علائم از یک دارو استفاده نموده اند. شایع ترین داروهای مرتبط (سولفونامیدها، داروهای ضد مالاریا، داروهای ضد صرع، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و آلوپرینول، علت بیماری معلوم نیست.

علائم بیماری:

- ♦ ضایعات حساس و منتشر شبیه آفتاب سوختگی به همراه تاول های پراکنده

که به سرعت تاول ها در هم ادغام گردیده و منجر به کنده شدن قسمت وسیعی از پوست می گردد.

- ♦ جدا شدن پوست سطح براق و بدون پوستی بر جای می گذارد که در لمس دردناک است.

- ♦ فشار ملایم به پوست اطراف سبب جدا شدن پوست می گردد.

- ♦ در سطح مخاط سائیدگی دردناک ایجاد می گردد.

- ♦ تب بالادرگیری دستگاههای بدن از جمله ریه، گوارش، دستگاه اعصاب مرکزی، و کلیه

تشخیص:

نمونه برداری از پوست

سیر و پیش آگهی بیماری:

- ♦ معمولاً قبل از شروع بیماری تب، بیحالی، کسالت، سرفه و درد شکم رخ می دهد.

- ♦ عواملی که پیش آگهی را بدتر میکنند: سن بالا، تاول گسترده، اختلال عملکرد کلیه، استفاده از داروهای متعدد و کاهش گلبول های سفید خون

درمان:

- ♦ کنترل درد
- ♦ شناسایی عفونت (کشت زخم) و درمان عفونت
- ♦ قطع داروهای مسبب بیماری
- ♦ تامین مایعات کافی و مواد مغزی



نکرولیز سمی اپیدرم TEN



تلفن های بیمارستان:

• ۵۲۸۸۸۲۸۲

پیامک بیمارستان

• ۳۰۰۰۲۴۰

وب سایت:

razihos.tums.ac.ir

ایمیل: razihospital@sina.tums.ac.ir

تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت

بیمارستان رازی

WIW-Pa-18-03

♦ پانسمان ضایعات

♦ در صورت درگیری شدید بستری در بخش سوختگی

♦ تزریق IVIG (در ابتدای سیر بیماری که میزان بقا را افزایش می دهد).

♦ کوتیکواستروئید سیستمیک (جلوگیری از پیشرفت بیماری ولی موجب افزایش خطر عفونت می شود جهت جلوگیری به مدت کوتاه و به همراه آنتی بیوتیک مصرف می شود).

♦ داروهای سرکوب کننده ایمنی (سیکلوسپورین و سیکلوفسفاماید)

♦ معاینات چشم پزشکی

♦ استفاده از دهانشویه

♦ داروی مخدر جهت کنترل درد