




نحوه تزریق انسولین:

سوzen را به طور کامل داخل پوست کنید. برای تزریق، دکمه‌ی فشاری را تا انتهای فشار دهید تا عدد صفر مقابل نشانگر قرار گیرد. بعد از تزریق تا زمان خارج کردن سوzen از پوست دکمه‌ی فشاری را کامل فشرده نگه دارید. سوzen باید حداقل ۶ ثانیه زیر پوست بماند تا اطمینان حاصل شود که دوز کامل وارد بدن شده است.



نکته:

انسولین برای تزریق زیر جلدی میباشد. هیچگاه انسولین را مستقیماً داخل ورید یا عضله تزریق نکنید.  
همیشه محل تزریق را تغییر دهید تا از ایجاد توده در محل تزریق جلوگیری نمایید.



آماده سازی برای هوایگیری:  
به منظور جلوگیری از تزریق هوا و اطمینان از مصرف دوز صحیح، لازم است قبل از هر بارتزریق، انتخاب کننده‌ی دوز را به اندازه ۲ واحد بچرخانید.

سپس قلم را به گونه‌ای که سرسوzen به سمت بالا باشد نگه دارید و با انگشت به ملایمت چند دفعه به محفظه‌ی انسولین ضربه بزنید سپس دکمه‌ی فشاری را تا آخر فشار دهید. انتخاب کننده دوز انسولین روی صفربرمی‌گردد.



باید از نوک سر سوzen یک قطره انسولین خارج شود. در غیراین صورت سرسوzen را تعویض نمایید و مراحل ذکر شده را تکرار نمایید. اگر همچنان قطره‌ی انسولین ظاهر نشده، قلم معیوب است و نباید استفاده کرد.

#### تنظیم دوز جهت تزریق:

به تعداد واحدهایی که قصد تزریق آن را دارید انتخاب کننده‌ی دوز را بچرخانید. در نظر داشته باشید که نمیتوان دوزی بیشتر از تعداد واحدهای با قیمانده در کارتريج را انتخاب نمود.

انسولینهای قلمی دارای ویژگیهای خاص میباشد که از طریق تکنولوژی نوترکیب و با ایجاد تغییراتی در اسیدآمینه موجود در مولکول انسولین تولید شده است.

#### شروع استفاده از انسولین قلمی (مخلوط کردن):

- ابتدا درپوش قلم را بردارید.
- قلم را در وضعیت افقی نگهداشته و آن را بین دو دست ۱۰ مرتبه بگردانید.
- سپس ۱۰ مرتبه به بالا و پایین حرکت دهید، تا زمانی که مایع به طور یکنواخت، شیری رنگ و کدر شود.
- بعد از مخلوط کردن، سوzen را به طور مستقیم و محکم به سر قلم بپیچانید.
- درپوش بزرگ خارجی و درپوش داخلی سرسوzen را بردارید.



## اصول تزریق انسولین قلمی



تلفن های بیمارستان:

۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن های گویای بیمارستان (نوبت دهی):

۶۷۳۹۵۰۶۰

پیامک بیمارستان

۳۰۰۰۲۴۰

وب سایت:

[razihospital.tums.ac.ir](http://razihospital.tums.ac.ir)

ایمیل: [razihospital@sina.tums.ac.ir](mailto:razihospital@sina.tums.ac.ir)

تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت  
بیمارستان رازی

IIW-Pa-16- 03

قلم در حال استفاده را در یخچال و یا در دمای بالاتر از ۳۰ درجه ی سانتیگراد نگهداری نکنید.

قلم در حال استفاده را میتوان تا ۴ هفته در دمای محیط (کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد) نگهداری نمود. اما بعد از این مدت باید مقادیر باقی مانده را دور انداخت.

برای محافظت در برابر نور، درپوش قلم را هنگامی که مورد استفاده نیست بسته نگهداری.

شايعترین مواردی که موجب آسیب به قلم می گردد:

در صورتیکه سرسوزن به طور صحیح سر قلم قرار نگیرد.

عدم توجه به شرایط دمایی مناسب جهت نگهداری از قلم انسولین در حال استفاده. جدا نکردن سرسوزن از قلم پس از هر نوبت تزریق.

نکات قابل توجه:

- از مصرف قلم بعد از تاریخ انقضای درج شده بر روی جعبه خودداری کنید.
- هر قلم جهت استفاده ی یک نفر می باشد.
- از پر کردن مجدد قلم خودداری کنید.

بهترین محلهای تزریق عبارتند از:

دیواره ی قدامی(جلویی) شکم، باسن، بازوها و جلوی رانها.

تزریق انسولین در شکم باعث جذب سریعتر انسولین نسبت به سایر محلهای تزریق می شود.



جدا کردن سر سوزن از قلم:

درپوش بزرگ خارجی سرسوزن را بگذارید و سوزن را برخلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز و سرسوزن را دور انداده و درپوش قلم را مجدد در جای خود قرار دهید برای هر تزریق از یک سر سوزن جدید استفاده کنید و سرسوزن را بعد از هر تزریق جدا نمایید. در غیر این صورت ممکن است به هنگام تغییر دما انسولین به بیرون نشست کند.

نگهداری از قلم انسولین:

بسته ی حاوی قلم استفاده نشده را در دمای ۲ الی ۸ درجه ی سانتیگراد (درون یخچال) نگهداری و از بخ زدگی حفاظت نمایید.