



داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی

داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، داروهایی هستند که اکثراً در بیماری های اتوایمیون و خاص مورد مصرف قرار می گیرند و با کم کردن سیستم ایمنی فعال شده بر علیه آن بیماری در درمان بیماری موثر می باشد. سر دسته این داروها آزاتیوپرین، سیکلوسپورین و مایکوفنولات مافتیل می باشند. آزاتیوپرین یک داروی سرکوب کننده ایمنی می باشد که اکثراً به همراه کورتون ها و بعنوان کمک دارو در درمان بیماری هایی نظیر لوپوس، درماتومیوزیت، بیماریهای تاولی، آگزمای مزمن و حاد مصرف می شود که بصورت قرص ۵۰ میلی گرم می باشد. قبل از درمان بایستی شمارش کامل سلول های خونی و تسمتهای کبدی و کلیوی و در صورت انجام سطح آنزیم TPMT انجام شود.

داروی سیکلوسپورین سرکوب کننده قوی سیستم ایمنی است که در موارد رد پیوند استفاده می شود و موارد استفاده پوستی در پسوریازیس شدید و آگزمای شدید، کهیر مزمن و بیماری های بافت همبند و پیودرما گانگرنوزم می باشد. این دارو به صورت کپسول های ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی موجود است. قبل از درمان و حین درمان معاینه کامل بیمار از جهت عفونت، بدخیمی و اندازه گیری فشار خون، تست های کلیوی، کبدی و چربی و GFR لازم است.

مایکوفنولات مافتیل یک داروی سرکوب کننده ایمنی نسبتاً جدید می باشد که در پوست در بیماری های تاولی اتوایمیون، پیودرما گانگروزوم، پسوریازیس و درماتیت آتوپیک استفاده می شود و به صورت کپسول های ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرمی موجود است. شمارش سلول های خونی، قبل و حین درمان لازم است.

تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت بیمارستان رازی

WIW-Pa-48-03

داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی

داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، داروهایی هستند که اکثراً در بیماری های اتوایمیون و خاص مورد مصرف قرار می گیرند و با کم کردن سیستم ایمنی فعال شده بر علیه آن بیماری در درمان بیماری موثر می باشد. سر دسته این داروها آزاتیوپرین، سیکلوسپورین و مایکوفنولات مافتیل می باشند. آزاتیوپرین یک داروی سرکوب کننده ایمنی می باشد که اکثراً به همراه کورتون ها و بعنوان کمک دارو در درمان بیماری هایی نظیر لوپوس، درماتومیوزیت، بیماریهای تاولی، آگزمای مزمن و حاد مصرف می شود که بصورت قرص ۵۰ میلی گرم می باشد. قبل از درمان بایستی شمارش کامل سلول های خونی و تسمتهای کبدی و کلیوی و در صورت انجام سطح آنزیم TPMT انجام شود.

داروی سیکلوسپورین سرکوب کننده قوی سیستم ایمنی است که در موارد رد پیوند استفاده می شود و موارد استفاده پوستی در پسوریازیس شدید و آگزمای شدید، کهیر مزمن و بیماری های بافت همبند و پیودرما گانگرنوزم می باشد. این دارو به صورت کپسول های ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی موجود است. قبل از درمان و حین درمان معاینه کامل بیمار از جهت عفونت، بدخیمی و اندازه گیری فشار خون، تست های کلیوی، کبدی و چربی و GFR لازم است.

مایکوفنولات مافتیل یک داروی سرکوب کننده ایمنی نسبتاً جدید می باشد که در پوست در بیماری های تاولی اتوایمیون، پیودرما گانگروزوم، پسوریازیس و درماتیت آتوپیک استفاده می شود و به صورت کپسول های ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرمی موجود است. شمارش سلول های خونی، قبل و

تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت بیمارستان رازی

WIW-Pa-48-03