

ریتوکسی مپ یک داروی بیولوژیک است که باعث غیر فعال شدن سلول های دفاعی B می شود. این سلول ها نوعی آنتی بادی تولید می کنند که در مبارزه بدن با میکروب ها و ویروس و عوامل خارجی نقش دارند.

شروع اثر دارو در مدت ۱۴ روز و اوج اثر آن در ۳ تا ۴ هفته و مدت اثر آن ۶ تا ۹ ماه می باشد.

موارد مصرف:

در پمفیگوس ، انواع لنفوم، آرتریت روماتوئید، لوسمی، کاهش پلاکت خون ، آنمی همولیتیک استفاده می شود.

این دارو بصورت هفته ای یکبار و به مدت چهار هفته متوالی تزریق می شود.

عوارض:

تب ، لرز، سرگیجه، ضعف، سردرد، درد قفسه سینه، تنگی نفس، تاکی کاردی(افزایش تعداد نبض)، قرمزی پوست ، کهیر، خارش، تهوع ، کم خونی، کاهش گلبول های سفید و..

مهمترین عوارض:

۱. افزایش قندخون در ۱۰ درصد موارد و کاهش آن ۳ درصد موارد

۲. کاهش فشارخون ولی در ۳ درصد موارد افزایش فشارخون

۳. آریتمی های قلبی (مشکلات قلبی)، نارسایی کلیه ، مشکلات ریوی

۴. مصرف در حاملگی ممنوع می باشد و در دوران شیردهی به علت ترشح موادی درخون که به علت مصرف دارو می باشد، نباید به بچه شیر داد.

۵. تا ۱۲ پس از مصرف دارو از حاملگی اجتناب گردد.

## بیماران عزیز لطفا به نکات زیر توجه فرمایید :

• جهت گرفتن نوبت تزریق به واحد پذیرش مراجعه کنید.

• تزریق شما در روز تزریق از زمان تشکیل پرونده و تا ترخیص در صورت نداشتن مشکل حدود ۶ ساعت به طول خواهد انجامید.

• دقت داشته باشید قبل از تزریق نوبت اول مشاوره های درخواستی پزشک مربوطه (مشاوره قلب و مشاوره عفونی) را انجام و اوراق مربوطه را به همراه بیاورید.

• قبل از روز تعیین شده دارو را تهیه کنید و در روز مقرر آن را به همراه داشته باشید.

- لطفا قبل از ساعت ۷:۳۰ جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش مراجعه کنید.
- داروی حل نشده در دمای ۲-۴ درجه سانتیگراد(طبقه وسط یخچال) قابل نگهداری می باشد.
- در صورت یخ زدن اثر دارو از بین خواهد رفت پس از گذاشتن دارو در فریزر جدا خودداری کنید.
- محلول آماده به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال و به مدت ۱۲ ساعت در دمای ۱۵ الی ۲۵ درجه (دمای اتاق) قابل نگه داری می باشد.
- به دلیل احتمال کاهش فشارخون ، مصرف داروهای ضد فشار را از ۱۲ ساعت قبل، طبق صلاحدید پزشک معالج قطع نمایید .
- به دلیل کاهش قندخون از گرسنگی طولانی مدت خودداری نمایید.
- در مواردی که قندخون بالا دارید داروهای پایین آورنده قند خون را مصرف نمایید.
- تعداد قطرات سرم طبق پروتکل توسط پرستار مسئول تنظیم می گردد و افزایش تعداد قطرات ممکن است منجر به عوارض جبران ناپذیری برای شما شود بنابراین از دستکاری سرم جدا خودداری نمایید .

# ریتوکسی ماب (MabThera)



تلفن های بیمارستان:

• ۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن دریافت انتقادات، پیشنهادات و

شکایات:

• ۵۵۶۳۴۴۶۱

پیامک بیمارستان

• ۳۰۰۰۲۴۰

وب سایت:

razihos.tums.ac.ir

ایمیل:

تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت بیمارستان

رازی

WIW-Pa-34-03

- در صورت درد شکم، به پرستار اطلاع دهید.
- در صورتی که قبل از تزریق علائم عفونت ویروسی مانند سرماخوردگی دارید به پزشک یا پرستار اطلاع دهید.
- تا دو ساعت پس از اتمام تزریق تحت نظر هستید سپس توسط پزشک ویزیت می شوید در صورت حال عمومی خوب مرخص می شوید.
- نسخه جهت تهیه نوبت بعدی ریتوکسی ماب را فراموش نکنید.
- باید بدانید که تزریق ریتوکسی ماب به این معنا نیست که پس از آن بهبودی ضایعات به طور کامل انجام می شود بلکه احتمال عود ضایعات رابه حداقل می رساند.
- زمانی که ریتوکسی ماب را دریافت میکنید رعایت رژیم غذایی و مصرف مرتب کورتون توجه داشته باشید با رعایت رژیم کم نمک، کم چرب، پر پروتئین، کم کربوهیدرات، مصرف مرتب کورتون ها و خودداری از قطع خودسرانه داروها، دوری از هرگونه اضطراب و استرس و مراجعه به درمانگاه پمفیگوس از ضروریات ادامه درمان می باشد.