

سالک:

سالک، یک بیماری پوستی انگلی مشترک بین انسان و حیوان از جمله جوندگان است که در مناطق گرمسیری بیشتر دیده می شود. عامل آن یک انگل به نام لیشمانیا است که درون سلول های بیگانه خوار پوست تکثیر می یابد این انگل در پوست انسان و سگ و جوندگان آلوده وجود دارد پس از خونخواری پشه خاکی از زخم های سالک این انگل در بدن پشه خاکی تکثیر یافته و پس از خونخواری مجدد پشه خاکی، به پوست فرد سالم راه می یابد و آن را مبتلا می کند.

انواع سالک:

۱. سالک خشک (شهری): ظاهر خشک و تعداد زخم ها کم و بدون درد میباشد. مخزن اصلی آن سگ و انسان می باشد.
۲. سالک مرطوب (روستایی): ظاهر مرطوب و تعداد زخمها زیاد و وسیع و دردناک میباشد. منبع این نوع جوندگان مثل موش صحرائی می باشد.

کانون سالک در ایران:

شهری: مشهد، شیراز، کرمان، نیشابور، کاشان
روستایی: نقاطی از استان اصفهان، جنوب فارس و



پشه خاکی ناقل سالک است

راههای انتقال سالک :

۱. انسان به انسان (تماس جنسی، انتقال خون، از طریق جفت) بسیار نادر است.
۲. حیوان به حیوان (از طریق لاشه حیوانات)
- ۳ حیوان به انسان و بالعکس

علائم :

در نوع خشک ۸ الی ۱۰ ماه پس از گزش ابتدا برآمدگی کوچک و قرمز ایجاد میشود. در نوع مرطوب چند هفته تا دو ماه پس از گزش برآمدگی کوچک و قرمز ایجاد و وسط آن زخم شده و حاشیه آن پیشرفت میکند که به شکل دهانه آتش فشان است که گاه همراه با التهاب عفونت و تب میباشد این ضایعه کمتر از یک سال دوام یافته و به صورت جوش گاه فرو رفته و برای تمام عمر باقی میماند.

راههای پیشگیری:

- نصب توری فلزی جلوی درب و پنجره
- استفاده از پشه بند
- جمع آوری و دفع سریع زباله ها و جلوگیری از تجمع آن
- استفاده از پمادهای دور کننده حشرات
- جلوگیری از جمع شدن پس مانده های غذایی

- تله گذاری و استفاده از سموم موش کش و پیر سازی گودال های مرطوب
- پوشاندن نقاط باز بدن در مواقع مسافرت به مناطق بومی
- حفاظت از زخم سالک با گاز استریل

عوارض:

محل زخم پس از بهبودی ایجاد بدشکلی بخصوص در صورت می کند بعلاوه عفونت زخم با سایر میکروب ها گاهی منجر به عوارض شدید می شود. گاهی نیز در اعضا حساس مثل بینی، پلک، گوش، موجب سوراخ شدگی و تغییر شکل قابل توجه می شود.



درمان :

در حال حاضر درمان اصلی سالک گلوکانتیم و کرایبو درمانی است. اگر ضایعه کم و در نواحی غیر صورت باشد هفته ای یکبار در اطراف ضایعه تزریق میشود در صورت بزرگ و متعدد بودن و یا قرار گرفتن در محل های حساس مثل مفاصل و صورت ضایعات به صورت عضلانی به مدت ۱ الی ۲ هفته تزریق می شود.

لئسمانیوز (سالک)



تلفن های بیمارستان:

• ۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات:

• ۵۵۶۳۴۴۶۱

پیامک بیمارستان

• ۳۰۰۰۲۴۰

وب سایت:

RAZIHOS.TUMS.AC.IR

ایمیل:

RAZIHOSPITAL@SINA.TUMS.AC.
IR

تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت

بیمارستان رازی

WIW-Pa-36-03

عوارض جانبی این داروها:

- درد در ناحیه تزریق
- بی اشتهایی
- تهوع و استفراغ
- درد عضلانی
- سر درد
- تغییرات نوار قلب که گاه نیاز به قطع آن میباشد.
- آموزش به بیمار:
- زخم را روزانه با سرم نرمال سالین شستشو دهید. سپس آن را با گاز استریل جهت پیشگیری از آلودگی بپوشانید.
- زخم های خود را از نظر التهاب، عفونت ، خونریزی بررسی کنید.
- درجه حرارت خود را کنترل کنید.
- رعایت بهداشت فردی (استفاده از وسائل شخصی مانند حوله - ملافه و لباس) جهت پیشگیری از انتقال بیماری ضروری است.
- دستها را به روش استاندارد که آموزش گرفته اید بشویید..
- رژیم غذایی پر پروتئین و میوه و سبزیجات جهت ترمیم زخم رعایت شود.
- جهت جلوگیری از خارش ، با آب ولرم حمام نمایید.
- ازدستکاری و خاراندن ضایعات پوستی خودداری نمایید.