

## نوروفیبروماتوز چیست؟

خصوصیات اصلی نوروفیبروماتوز وجود لکه‌های شیرقهوه‌ای و کک و مک در زیر بغل و نوروفیبروم‌های متعدد پوستی (تومورهای خوش خیم با منشأ عصبی در زیر پوست)، ضایعه



استخوانی، داشتن رابطه‌ی خویشاوندی درجه یک با بیمار مبتلا به نوروفیبروماتوز و کاهش سطح هوشی بیماران می‌باشد.

1

## تشخیص:

تشخیص از راه کلینیکی با پزشک است. **MRI** و سی تی اسکن در تشخیص کمک کننده است. نمونه برداری، راهی دیگر برای تشخیص این بیماری محسوب می شود.



## عوارض نوروفیبروماتوز:

- تشنج در حدود ۴۰ درصد
- فشار خون بالا
- انحراف جانبی ستون مهره،
- اختلالات تکلم
- تومور عصب بینایی و نابینایی
- کاهش شنوایی

2

- شروع زودرس یا دیررس بلوغ
- مشکلات استخوانی و درد شدید

## درمان:

درمانی قطعی برای این بیماری وجود ندارد، اما در صورت لزوم (زیبایی یا فشار بر نواحی حساس) جراحی و برداشتن تومورها به طور کامل از طریق جراحی صورت می‌گیرد.



3

## نوروفیبروماتوز



تلفن های بیمارستان:

• ۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن های گویای بیمارستان (نوبت دهی):

• ۶۷۳۹۵۰۶۰

پيامک بیمارستان

• ۳۰۰۰۲۴۰

وب سايت:

razihos.tums.ac.ir

ايميل:

razihospital@sina.tums.ac.ir

تهيه کننده: کارگروه آموزش سلامت

بیمارستان رازی

GOR-Pa-02-03

۳- در صورت ابتلا به دیابت، فشار خون بالا و سایر بیماریها داروهای خود را پس از مشورت با پزشک معالج طبق روال همیشگی مصرف نمایید.

۴- در صورت مصرف هپارین، وارفارین و یا آسپرین طبق نظر پزشک معالج (قلب و یا بیهوشی) در مورد ادامه و قطع دارو عمل نمایید.

۵- در صورت ابتلا به بیماریهای عفونی مانند هیپاتیت، ایدز و ... به پزشک اطلاع دهید.

۶- در صورت داشتن حساسیت به دارویا مواد غذایی به پزشک اطلاع دهید.

۷- در صورت مصرف هر گونه دارو و یا داشتن اعتیاد به مواد به پزشک خود اطلاع دهید.

۸- در صورت بارداری و شیردهی به پزشک معالج اطلاع دهید.

۹- شب قبل از عمل به شما داروی خواب آور و آرام بخش داده می شود در صورت نیاز به پایین آمدن از تخت در طول شیفت شب با استفاده از زنگ اخبار به پرسنل پرستاری جهت کمک اطلاع دهید.



در صورت وجود ضایعات در اطراف اعصاب شنوایی، ممکن است عمل جراحی موجب از دست دادن شنوایی بیمار شود. برداشتن نسبی تومور و سپس رادیوتراپی، از جمله دیگر روشهای مورد استفاده در درمان نوروفیبروماتوز، می باشند. در صورتی که رشد تومورها سریع نباشد، بهتر است که بیمار فقط تحت نظر باشد.

1- شب قبل از عمل حمام نمائید. محل عمل جراحی نباید موی زائد داشته باشد. به این منظور می توانید از کرمهای مو بریا ژیلت یکبار مصرف استفاده کنید.

2- شب قبل از عمل شام سبک میل نمایید و از ۱۲ شب به بعد ناشتا باشید.