

معیارهای زیبایی صورت در فرهنگ های مختلف، متفاوت است ولی امروزه دسترسی گسترده به اینترنت و ماهواره و ارتباط و نزدیکی مردم مناطق مختلف دنیا، تفاوت های فرهنگی را کمرنگ تر کرده است. به عبارت دیگر ذهنیت مردم در رابطه با زیبایی چهره، در جای جای این کره خاکی به هم شبیه شده است در فرهنگ غالب امروزی، زیبایی صورت با این ویژگی ها توصیف می شود: چانه برجسته و زاویه دار، گونه های برجسته و بالا، بینی با پشت صاف و بالاخره لبهای پر و برجسته.

پروتز چانه با تقویت چانه و زاویه دار ساختن صورت موجب زیبایی بیشتر چهره می گردد.

*امروزه جراحی چانه همزمان با جراحی بینی بر زیبایی و جوانی چهره اثری بسزا دارد.*

ممکن است بطور همزمان جراحی های دیگری نیز در صورت انجام شود؟

معمولا در افرادی که چانه کوچکی دارند، بینی بزرگ تر از حد طبیعی به نظر می رسد و به چهره حالتی شبیه به صورت پرنندگان می دهد. جلو آوردن چانه گاهی نیاز به جراحی بینی را برطرف می سازد و چنانچه بینی نیاز به کوچک شدن داشته باشد نوع پوست، نژاد، سن به همراه درجه اختلال و نوع کارکرد از جمله فاکتورهای مهم و موثر در بروز نتیجه جراحی همزمان آنها تغییرات شگرفی در صورت فرد ایجاد می کند.

### آمادگیهای لازم قبل از عمل جراحی

- ۱- باید حداقل دو عکس رادیوگرافی و فتوگرافی های صورت از زوایای مختلف گرفته شود تا جراح بتواند با تجزیه و تحلیل آنها روش مناسب جراحی را برگزیند.
- ۲- بیمار باید از نظر سلامت عمومی و بهداشت دهان و دندان مورد بررسی قرار گیرد.

۳- در صورتیکه قبل از عمل به سرماخوردگی، گلودرد، تبخال یا هر بیماری دیگری مبتلا شدید به پزشک اطلاع دهید.

۴- شب قبل از عمل حمام نموده و موهای زائد محل عمل جراحی را شیو نمایید اصلاح صورت برای آقایان، و پاک کردن آرایش صورت و لاک ناخن برای خانمها ضروری است.

۵- شب قبل از عمل شام سبک میل نمایید و از ۱۲ شب به بعد ناشتا باشید .

۶- در صورت ابتلا به دیابت - فشار خون بالا و سایر بیماریها داروهای خود را پس از مشورت با پزشک معالج طبق روال همیشگی مصرف نمایید.

۷- در صورت مصرف هپارین ویا آسپرین یک هفته قبل از عمل دارو را پس از مشورت با پزشک معالج قطع نمایید .

۸- در صورت مصرف وارفارین به پزشک اطلاع دهید .

۹- در صورت ابتلا به بیماریهای عفونی مانند هپاتیت-ایدز و ... به پزشک اطلاع دهید .

## پروتز چانه



تلفن های بیمارستان:

• ۵۲۸۸۸۲۸۲

تلفن های گویای بیمارستان (نوبت دهی):

• ۶۷۳۹۵۰۶۰

پیامک بیمارستان

• ۳۰۰۰۲۴۰

وب سایت:

razihos.tums.ac.ir

ایمیل:

razihospital@sina.tums.ac.ir

تهیه کننده: کارگروه آموزش سلامت

بیمارستان رازی

GOR-Pa-13-03

- ۳- سیگار کشیدن و همچنین استنشاق دود سیگار سبب به تاخیر افتادن فرآیند ترمیم شده و باید شدیداً اجتناب گردد.
- ۴- شما باید تا ۲ هفته پس از عمل فقط مایعات و غذاهای آبکی با استفاده از نی مصرف نمایید.
- ۵- درد جزئی، کبودی و تورم پس از عمل طبیعی است. استفاده از مسکن، کیسه یخ و مقداری صبر و تحمل لازم است.
- ۶- چسب یا بریس پس از یک هفته برداشته میشود.
- ۷- بیمار پس از ۵ تا ۷ روز (بسته به نوع جراحی) می تواند فعالیت های عادی خود را از سر گیرد.
- ۸- در صورت افزایش درد یا تورم پزشک خود را مطلع نمایید.

۱۰- در صورت بارداری یا شیردهی به پزشک اطلاع دهید .

۱۱- در صورت مصرف هر گونه دارو و یا داشتن اعتیاد به مواد مخدر یا الکل به پزشک اطلاع دهید .

۱۲- در صورت داشتن حساسیت به دارو یا مواد غذایی به پزشک اطلاع دهید .

۱۳- برای شما عکس درخواست می شود که شما باید آنرا از طریق مراکز فتوگرافی پزشکی تهیه نمایید.

### مراقبتهای لازم پس از عمل

- ۱- دستور دارویی خود را طبق نسخه تجویز شده دقیقاً و کامل اجرا نمایید .
- ۲- تنها مسکن مجاز در هفته اول پس از عمل استامینوفن است و شما باید از هرگونه داروی ضد درد دیگر اجتناب نمایید.